

Acacia dealbata

Falsche Mimose, Silber-Akazie, Silver Wattle

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt werden. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine hohe Strukturstabilität und wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff-Speichervermögen wird optimiert.

Umtopfen: Das Umtopfen von *Acacia dealbata* erfolgt jährlich im zeitigen Frühjahr (März), sofern das Substrat gut und reich durchwurzelt ist. Das neue Pflanzgefäß sollte nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige.

Schnitt: Der Schnitt der Silberakazie ist gegen Ende des Winter zu bewerkstelligen. Hierbei können Seitentriebe eingekürzt werden, der Haupttrieb des Stammes sollte jedoch erhalten bleiben. Blüten für die Folgesaison werden bereits im Sommer angelegt, daher ist der Schnitt im Herbst nicht ratsam.

Schädlinge: Akazien werden nur sehr selten von Schädlingen heimgesucht. Bei temperierter Überwinterung können sich Schildläuse oder Wollläuse einstellen, im Frühjahr können in seltenen Fällen Blattläuse am frischen Grün auftreten.

Im Sommer

Standort: *Acacia dealbata* liebt vollsonnige, lichtdurchflutete Standorte. Hitzeperioden sind bei gleichzeitig konstanter Substratfeuchte unproblematisch.

Gießen: Der Wasserbedarf der Akazien ist hoch, konstant leicht feuchtes Substrat empfehlenswert, daher ist regelmäßig zu gießen, dauerhafte Staunässe ist jedoch zu vermeiden (Achtung bei Untersetzern!). Kurze Trockenphasen werden meist gut verkraftet, solange diese nicht zur Regel werden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf der *Acacia dealbata* ist ebenfalls hoch, daher von März bis September im wöchentlichen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen) verwenden. Alternativ kann beim Umtopfen Langzeitdünger zum Einsatz kommen.

Im Winter

Standort: *Acacia dealbata*, von Natur aus immergrün, wird sehr hell bei Temperaturen zwischen 5° und 12° C überwintert. Für Laubabwurf ist wiederholte Trockenheit oder ein zu dunkler Standort verantwortlich. Der Neuaustrieb erfolgt meist ab März / April. Kurzzeitiges Temperaturminimum: -10° C.

Gießen: Gleichmäßige Substratfeuchte beibehalten und Staunässe vermeiden. Das Gießen ist dem in der dunklen Jahreszeit geringeren Bedarf der Silberakazie anzupassen. In Wintergärten und Gewächshäusern kann der Bedarf bei winterlicher Besonnung sprunghaft ansteigen.