

## Lagerstroemia indica

Flieder des Südens, Kräuselmirthe, Lagerstroemie, Kreppmyrte

**Kultur-Substrat:** Hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt werden. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine hohe Strukturstabilität, wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff- Speichervermögen wird optimiert.

**Umtopfen:** Das Umtopfen der Lagerstroemia indica erfolgt jährlich im zeitigen Frühjahr (März), wenn das Substrat kräftig und reich durchwurzelt ist. Das neue Pflanzgefäß sollte nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige.

**Schnitt:** Der Schnitt der Kreppmyrte ist gegen Ende des Winter zu bewerkstelligen, kurz bevor sich der Neuaustrieb bemerkbar macht. Lagerstroemia indica ist sehr gut schnittverträglich. Blüten entstehen immer nur an den frischen, neu gebildeten Trieben der aktuellen Vegetationsperiode, daher kann mit gekonnten Schnittmaßnahmen die Blüte forciert werden.

**Schädlinge:** Schädlingsbefall ist bei Lagerstroemia indica nicht bekannt, jedoch kann es am ungünstigen Standort zum Mehltau-Befall kommen. Daher ist ein luftiger Standort zu wählen, um ein schnelles Abtrocknen des Blattwerks nach Regenfällen zu gewährleisten.

Im Sommer

**Standort:** Ein heller, vollsonniger und luftiger Standort ist für Lagerstroemia indica bestens geeignet. Halbschatten wird toleriert. Aufgrund der recht ausgeprägten Kältetoleranz kann die Kreppmyrte in gemäßigten Zonen ausgepflanzt werden. Hierbei ist auf gut drainiertes, humoses Substrat zu achten.

**Gießen:** Der Wasserbedarf der Kreppmyrte ist mäßig. Konstant leicht feuchtes Substrat ist empfehlenswert, daher regelmäßig gießen, dauerhafte Staunässe ist zu vermeiden (Achtung bei Untersetzern von Kübelpflanzen!).

**Düngen:** Der Nährstoffbedarf der Lagerstroemia indica ist ebenfalls mäßig, daher von April bis September im 2 Wochen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen) verwenden. In wintermilden Regionen ausgepflanzte Exemplare erhalten im Frühjahr eine Gabe Kompost, welche im Juni / Juli wiederholt wird.

Im Winter

**Standort:** Lagerstroemia indica wird in Kübelhaltung bei Temperaturen zwischen 0° und 12° C überwintert. In wintermilden Regionen ist an ein Auspflanzen der Kreppmyrte zu denken, natürlich nicht ohne jeglichen Winterschutz mit Laub, Reisig oder ähnlichem. Der Neuaustrieb erfolgt meist ab April / Mai. Kurzzeitiges Temperaturminimum: -15° C.

**Gießen:** Gleichmäßige Substratfeuchte beibehalten und Staunässe vermeiden. Bei ausgepflanzten Kreppmyrten kann die Wintersonne viel Feuchtigkeit entziehen, welche bei gefrorenem Boden nicht nachgeliefert werden kann. Hier ist in Trockenphasen Zuwässern empfehlenswert.